



AMBITO

TERRITORIALE

DI CACCIA

PROVINCIA DI FOGGIA

**Carta della vocazionalità
faunistica ATC
Provincia di Foggia**

PARTE II - STARNA

Parte II – *Sterna Perdix perdix*

STARNA

Sulla base delle analisi realizzate è stata attribuita una idoneità nulla nel 16,5% del territorio (1125 km²), idoneità bassa nel 13,5% (941 km²), idoneità media nel 58,2% (4054 km²) e idoneità alta nel 12,1% (841 km²). Infine è stata realizzata la carta della idoneità del territorio per la starna (Figura1).




Figura 1 - Carta dell'idoneità dell'Ambito Territoriale di Foggia per la starna

Accadia

Il territorio comunale di Accadia è classificato a idoneità nulla per il 20,8%, a idoneità bassa per il 6,5%, a idoneità media per il 43,4% e a idoneità alta per il 29,3% (Figura 2).




Figura 2 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Accadia

Alberona

Il territorio comunale di Alberona è classificato a idoneità nulla per il 25,9%, a idoneità bassa per il 2%, a idoneità media per il 60,1% e a idoneità alta per il 12% (Figura 3).




Figura 3 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Alberona

Anzano di Puglia

Il territorio comunale di Anzano di Puglia è classificato a idoneità nulla per il 31,6%, a idoneità bassa per il 0%, a idoneità media per il 35,6% (6.637 ha) e a idoneità alta per il 16% (Figura 4).




Figura 4 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Anzano di Puglia

Apricena

Il territorio comunale di Apricena è classificato a idoneità nulla per il 13,3%, a idoneità bassa per il 3,4%, a idoneità media per il 66,1% e a idoneità alta per il 17,2% (Figura 5).




Figura 5 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Apricena

Ascoli Satriano

Il territorio comunale di Ascoli Satriano è classificato a idoneità nulla per il 2,4%, a idoneità bassa per il 4,1%, a idoneità media per il 90,4% e a idoneità alta per il 3,1% (Figura 6).




Figura 6 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Ascoli Satriano

Biccari

Il territorio comunale di Biccari è classificato a idoneità nulla per il 11,6%, a idoneità bassa per il 5,6%, a idoneità media per il 78,9% e a idoneità alta per il 3,9% (Figura 7).




Figura 7 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Biccari

Bovino

Il territorio comunale di Bovino è classificato a idoneità nulla per il 8,3%, a idoneità bassa per il 8,9%, a idoneità media per il 71,9% e a idoneità alta per il 10,9% (300 ha) (Figura 8).




Figura 8 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Bovino

Cagnano Varano

Il territorio comunale di Cagnano Varano è classificato a idoneità nulla per il 21,1%, a idoneità bassa per il 8,6%, a idoneità media per il 45,4% e a idoneità alta per il 24,9% (Figura 9).




Figura 9 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Cagnano Varano

Candela

Il territorio comunale di Candela è classificato a idoneità nulla per il 1%, a idoneità bassa per il 3,1%, a idoneità media per il 90,3% e a idoneità alta per il 5,6% (Figura 10).




Figura 10 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Candela

Carapelle

Il territorio comunale di Carapelle è classificato a idoneità nulla per il 1,8%, a idoneità bassa per il 7,5%, a idoneità media per il 81,5% e a idoneità alta per il 9,2% (Figura 11).




Figura 11 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Carapelle

Carlantino

Il territorio comunale di Carlantino è classificato a idoneità nulla per il 25,4%, a idoneità bassa per il 11,7%, a idoneità media per il 54,2% e a idoneità alta per il 8,7% (Figura 12).




Figura 12 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Carlantino

Carpino

Il territorio comunale di Carpino è classificato a idoneità nulla per il 24,7%, a idoneità bassa per il 31,1%, a idoneità media per il 13,8% e a idoneità alta per il 30,4% (Figura 13).




Figura 13 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Carpino

Casalnuovo Monterotaro

Il territorio comunale di Casalnuovo Monterotaro è classificato a idoneità nulla per il 12,5%, a idoneità bassa per il 4,5%, a idoneità media per il 65,8% e a idoneità alta per il 17,2% (Figura 14).




Figura 14 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Casalnuovo Monterotaro

Casalvecchio di Puglia

Il territorio comunale di Casalvecchio di Puglia è classificato a idoneità nulla per il 5,5%, a idoneità bassa per il 11%, a idoneità media per il 63,9% (6.637 ha) e a idoneità alta per il 10,7% (Figura 15).




Figura 15 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Casalvecchio di Puglia

Castelluccio dei Sauri

Il territorio comunale di Castelluccio dei Sauri è classificato a idoneità nulla per il 5,8%, a idoneità bassa per il 7,6%, a idoneità media per il 83,6% e a idoneità alta per il 3% (Figura 16).




Figura 16 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Castelluccio dei Sauri

Castelluccio Valmaggior

Il territorio comunale di Castelluccio Valmaggior è classificato a idoneità nulla per il 25,9%, a idoneità bassa per il 3,7%, a idoneità media per il 61,6% e a idoneità alta per il 8,8% (Figura 17).




Figura 17 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Castelluccio Valmaggior

Castelnuovo della Daunia

Il territorio comunale di Castelnuovo della Daunia è classificato a idoneità nulla per il 9,2%, a idoneità bassa per il 3,4%, a idoneità media per il 83,7% e a idoneità alta per il 3,7% (Figura 18).




Figura 18 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Castelnuovo della Daunia

Celenza Valfortore

Il territorio comunale di Celenza Valfortore è classificato a idoneità nulla per il 29,8%, a idoneità bassa per il 6,8%, a idoneità media per il 44,3% e a idoneità alta per il 19,1% (Figura 19).




Figura 19 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Celenza Valfortore

Celle San Vito

Il territorio comunale di Celle San Vito è classificato a idoneità nulla per il 20,9%, a idoneità bassa per il 0%, a idoneità media per il 56% e a idoneità alta per il 23,1% (Figura 20).





Figura 20 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Celle San Vito

Cerignola

Il territorio comunale di Cerignola è classificato a idoneità nulla per il 1,9%, a idoneità bassa per il 35,5%, a idoneità media per il 59,7% e a idoneità alta per il 2,9% (Figura 21).



Legenda

SIC/ZPS/ZSC

AREE PROTETTE

- Parco Nazionale
- Parco Naturale Regionale
- Riserva Naturale Marina
- Riserva Naturale Statale Biogenetica
- Riserva Naturale Statale Integrale
- Riserva Naturale Statale Integrale e Biogenetica
- Riserva Naturale Statale Orientata e Biogenetica
- Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale

STARNA

Vocazione faunistica

- Nulla
- Bassa
- Media
- Alta

0 2,5 5 10 km

Figura 21 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Cerignola

Chieuti

Il territorio comunale di Chieuti è classificato a idoneità nulla per il 14,8%, a idoneità bassa per il 4,9%, a idoneità media per il 73,5% e a idoneità alta per il 6,8% (Figura 22).




Figura 22 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Chieuti

Deliceto

Il territorio comunale di Deliceto è classificato a idoneità nulla per il 18,5%, a idoneità bassa per il 4%, a idoneità media per il 73,7% e a idoneità alta per il 3,8% (Figura 23).




Figura 23 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Deliceto

Faeto

Il territorio comunale di Faeto è classificato a idoneità nulla per il 18,7%, a idoneità bassa per il 0%, a idoneità media per il 53,8% e a idoneità alta per il 27,5% (Figura 24).




Figura 24 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Faeto

Foggia

Il territorio comunale di Foggia è classificato a idoneità nulla per il 9,2%, a idoneità bassa per il 8,4%, a idoneità media per il 78,5% e a idoneità alta per il 3,9% (Figura 25).




Figura 25 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Foggia

Ischitella

Il territorio comunale di Ischitella è classificato a idoneità nulla per il 22,7%, a idoneità bassa per il 57,1%, a idoneità media per il 5,7% e a idoneità alta per il 14,5% (Figura 26).




Figura 26 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Ischitella

Lesina

Il territorio comunale di Lesina è classificato a idoneità nulla per il 6,6%, a idoneità bassa per il 1,3%, a idoneità media per il 89% e a idoneità alta per il 3,1% (Figura 27).




Figura 27 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Lesina

Lucera

Il territorio comunale di Lucera è classificato a idoneità nulla per il 5,3%, a idoneità bassa per il 7,1%, a idoneità media per il 85,2% e a idoneità alta per il 2,4% (Figura 28).




Figura 28 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Lucera

Manfredonia

Il territorio comunale di Manfredonia è classificato a idoneità nulla per il 5,6%, a idoneità bassa per il 6,6%, a idoneità media per il 72,9% e a idoneità alta per il 14,9% (Figura 29).




Figura 29 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Manfredonia

Mattinata

Il territorio comunale di Mattinata è classificato a idoneità nulla per il 30,2%, a idoneità bassa per il 28,6%, a idoneità media per il 14,4% e a idoneità alta per il 26,8% (Figura 30).




Figura 30 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Mattinata

Monte Sant'Angelo

Il territorio comunale di Monte Sant'Angelo è classificato a idoneità nulla per il 59,8%, a idoneità bassa per il 6%, a idoneità media per il 6,6% e a idoneità alta per il 27,6% (Figura 31).




Figura 31 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Monte Sant'Angelo

Monteleone di Puglia

Il territorio comunale di Monteleone di Puglia è classificato a idoneità nulla per il 11,9%, a idoneità bassa per il 0%, a idoneità media per il 85,9% e a idoneità alta per il 2,2% (Figura 32).




Figura 32 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Monteleone di Puglia

Motta Montecorvino

Il territorio comunale di Motta Montecorvino è classificato a idoneità nulla per il 22,8%, a idoneità bassa per il 0%, a idoneità media per il 77,2% e a idoneità alta per il 0% (Figura 33).





Figura 33 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Motta Montecorvino

Ortona

Il territorio comunale di Ortona è classificato a idoneità nulla per il 3,4%, a idoneità bassa per il 3,5%, a idoneità media per il 90,6% e a idoneità alta per il 2,5% (Figura 34).



Legenda

SIC/ZPS/ZSC

AREE PROTETTE

- Parco Nazionale
- Parco Naturale Regionale
- Riserva Naturale Marina
- Riserva Naturale Statale Biogenetica
- Riserva Naturale Statale Integrale
- Riserva Naturale Statale Integrale e Biogenetica
- Riserva Naturale Statale Orientata e Biogenetica
- Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale

STARNA

Vocazione faunistica

- Nulla
- Bassa
- Media
- Alta

0 1 2 4 km

Figura 34 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Ortona

Orsara di Puglia

Il territorio comunale di Orsara di Puglia è classificato a idoneità nulla per il 25,2%, a idoneità bassa per il 2,6%, a idoneità media per il 61% e a idoneità alta per il 11,2% (Figura 35).




Figura 35 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Orsara di Puglia

Orta Nova

Il territorio comunale di Orta Nova è classificato a idoneità nulla per il 3,6%, a idoneità bassa per il 29,5% a idoneità media per il 63,9% e a idoneità alta per il 2,9% (Figura 36).




Figura 36 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Orta Nova

Panni

Il territorio comunale di Panni è classificato a idoneità nulla per il 27,6%, a idoneità bassa per il 3,7%, a idoneità media per il 49,4% e a idoneità alta per il 19,3% (Figura 37).




Figura 37 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Panni

Peschici

Il territorio comunale di Peschici è classificato a idoneità nulla per il 70,3%, a idoneità bassa per il 13,9%, a idoneità media per il 12,3% e a idoneità alta per il 3,5% (Figura 38).




Figura 38 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Peschici

Pietra Montecorvino

Il territorio comunale di Pietra Montecorvino è classificato a idoneità nulla per il 18%, a idoneità bassa per il 5,6%, a idoneità media per il 73,3% e a idoneità alta per il 3,1% (Figura 39).




Figura 39 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Pietra Montecorvino

Poggio Imperiale

Il territorio comunale di Poggio Imperiale è classificato a idoneità nulla per il 6,4%, a idoneità bassa per il 3,6%, a idoneità media per il 82,5% e a idoneità alta per il 7,5% (Figura 40).




Figura 40 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Poggio Imperiale

Rignano Garganico

Il territorio comunale di Rignano Garganico è classificato a idoneità nulla per il 18,2%, a idoneità bassa per il 6,7%, a idoneità media per il 53,7% e a idoneità alta per il 21,4% (Figura 41).




Figura 41 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Rignano Garganico

Rocchetta Sant'Antonio

Il territorio comunale di Rocchetta Sant'Antonio è classificato a idoneità nulla per il 10,1%, a idoneità bassa per il 0%, a idoneità media per il 76% e a idoneità alta per il 13,9% (Figura 42).




Figura 42 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Rocchetta Sant'Antonio

Rodi Garganico

Il territorio comunale di Rodi Garganico è classificato a idoneità nulla per il 16,6%, a idoneità bassa per il 73,6%, a idoneità media per il 5,3% e a idoneità alta per il 4,5% (Figura 43).




Figura 43 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Rodi Garganico

Roseto Valfortore

Il territorio comunale di Roseto Valfortore è classificato a idoneità nulla per il 26,5%, a idoneità bassa per il 0% (3.066 ha), a idoneità media per il 57% e a idoneità alta per il 16,5% (Figura 44).




Figura 44 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Roseto Valfortore

San Giovanni Rotondo

Il territorio comunale di San Giovanni Rotondo è classificato a idoneità nulla per il 13,9%, a idoneità bassa per il 13,5%, a idoneità media per il 39,7% e a idoneità alta per il 32,9% (Figura 45).




Figura 45 - Idoneità ambientale per la starna del comune di San Giovanni Rotondo

San Marco in Lamis

Il territorio comunale di San Marco in Lamis è classificato a idoneità nulla per il 22,8%, a idoneità bassa per il 2,8%, a idoneità media per il 30,9% (6.637 ha) e a idoneità alta per il 43,5% (Figura 46).




Figura 46 - Idoneità ambientale per la starna del comune di San Marco in Lamis

San Marco la Catola

Il territorio comunale di San Marco la Catola è classificato a idoneità nulla per il 32,4%, a idoneità bassa per il 5,3%, a idoneità media per il 63,9% (6.637 ha) e a idoneità alta per il 12,3% (Figura 47).




Figura 47 - Idoneità ambientale per la starna del comune di San Marco la Catola

San Nicandro Garganico

Il territorio comunale di San Nicandro Garganico è classificato a idoneità nulla per il 20,9%, a idoneità bassa per il 7,8%, a idoneità media per il 47,6% e a idoneità alta per il 23,7% (Figura 48).




Figura 48 - Idoneità ambientale per la starna del comune di San Nicandro Garganico

San Paolo Civitate

Il territorio comunale di San Paolo Civitate è classificato a idoneità nulla per il 5%, a idoneità bassa per il 29,2%, a idoneità media per il 62,5% e a idoneità alta per il 3,3% (Figura 49).




Figura 49 - Idoneità ambientale per la starna del comune di San Paolo Civitate

San Severo

Il territorio comunale di San Severo è classificato a idoneità nulla per il 4,3%, a idoneità bassa per il 28,5%, a idoneità media per il 63,9% e a idoneità alta per il 3,3% (Figura 50).




Figura 50 - Idoneità ambientale per la starna del comune di San Severo

Sant'Agata di Puglia

Il territorio comunale di Sant'Agata di Puglia è classificato a idoneità nulla per il 9,5%, a idoneità bassa per il 1,6%, a idoneità media per il 75,1% e a idoneità alta per il 13,8% (Figura 51).




Figura 51 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Sant'Agata di Puglia

Serracapriola

Il territorio comunale di Serracapriola è classificato a idoneità nulla per il 4,2%, a idoneità bassa per il 8,4%, a idoneità media per il 81,3% e a idoneità alta per il 6,1% (Figura 52).




Figura 52 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Serracapriola

Stornara

Il territorio comunale di Stornara è classificato a idoneità nulla per il 0%, a idoneità bassa per il 56,6%, a idoneità media per il 43,4% e a idoneità alta per il 0% (Figura 53).




Figura 53 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Stornara

Stornarella

Il territorio comunale di Stornarella è classificato a idoneità nulla per il 2,9%, a idoneità bassa per il 28,9%, a idoneità media per il 68,2% e a idoneità alta per il 0% (Figura 54).




Figura 54 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Stornarella

Torremaggiore

Il territorio comunale di Torremaggiore è classificato a idoneità nulla per il 5,9%, a idoneità bassa per il 33,2%, a idoneità media per il 58,7% e a idoneità alta per il 2,2% (Figura 55).




Figura 55 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Torremaggiore

Troia

Il territorio comunale di Troia è classificato a idoneità nulla per il 5,4%, a idoneità bassa per il 6,4%, a idoneità media per il 85% e a idoneità alta per il 3,2% (Figura 56).




Figura 56 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Troia

Vico del Gargano

Il territorio comunale di Vico del Gargano è classificato a idoneità nulla per il 64,8%, a idoneità bassa per il 19%, a idoneità media per il 2,5% e a idoneità alta per il 13,7% (Figura 57).




Figura 57 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Vico del Gargano

Vieste

Il territorio comunale di Vieste è classificato a idoneità nulla per il 51,5%, a idoneità bassa per il 17,6%, a idoneità media per il 17,2% e a idoneità alta per il 13,7% (Figura 58).




Figura 58 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Vieste

Volturara Appula

Il territorio comunale di Volturara Appula è classificato a idoneità nulla per il 36,6%, a idoneità bassa per il 1,9%, a idoneità media per il 57,1% e a idoneità alta per il 4,4% (Figura 59).




Figura 59 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Volturara Appula

Volturino

Il territorio comunale di Volturino è classificato a idoneità nulla per il 21,9%, a idoneità bassa per il 3,4%, a idoneità media per il 69,5% e a idoneità alta per il 5,2% (Figura 60).




Figura 60 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Volturino

Zapponeta

Il territorio comunale di Zapponeta è classificato a idoneità nulla per il 1,7%, a idoneità bassa per il 2,5%, a idoneità media per il 83,3% e a idoneità alta per il 12,5% (Figura 61).




Figura 61 - Idoneità ambientale per la starna del comune di Zapponeta

Note

